

INFORMATION ZUR SCHUTZIMPFUNG

GEGEN COVID-19 MIT COMIRNATY® LP.8.1 (mRNA, 0,3 ML)

WAS IST COVID-19?

COVID-19 ist eine durch das Virus SARS-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit. Die Erkrankung kann von milden Symptomen (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Geschmacks-/Geruchsverlust) bis hin zu schweren Verläufen mit Lungenentzündung, Atemnot, Herz- und Gefäßkomplikationen reichen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit chronischen Vorerkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf, Diabetes, Lunge, Nieren) und immungeschwächte Personen.

Das Virus verändert sich durch Mutationen laufend. Deshalb wird der Impfstoff regelmäßig angepasst, um gegen neue Virusvarianten bestmöglichen Schutz zu bieten.

SCHUTZWIRKUNG DER IMPFUNG

COMIRNATY® LP.8.1 ist ein mRNA-Impfstoff. Er enthält die Bauanleitung für ein Oberflächenprotein (Spike-Protein) von SARS-CoV-2. Der Körper stellt dieses Protein kurzfristig her, wodurch das Immunsystem Antikörper und Abwehrzellen bildet.

WER SOLLTE SICH AUFFRISCHEN LASSEN?

Die Impfauffrischung wird empfohlen für:

1. Personen mit besonderen Gründen:
 - Schwangerschaft
 - chronische Grunderkrankung von Lunge/Herz/Nieren/Stoffwechsel/Nerven/Psychie oder chronisch-entzündliche Erkrankungen
 - Krebserkrankungen, Einschränkungen des Immunsystems
 - Fettleibigkeit (BMI > 30)
 - Personen die in Alten- oder Pflegeheimen betreut werden oder Personen mit intellektuellen oder körperlichen Behinderungen.
2. Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich
3. Alle Personen ab 12 Jahren

Kinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren können in der PVE Sonnwendviertel **nicht** geimpft werden, da kein altersgerechter Impfstoff vorliegt (separate Formulierungen).

Kinder zwischen 5 und 12 Jahren können mit der **reduzierten Dosis** des Erwachsenenimpfstoffes geimpft werden (0,1ml).

DURCHFÜHRUNG

- Dosis: 0,3 ml COMIRNATY® LP.8.1
- Art der Verabreichung: intramuskulär, bevorzugt in den Oberarmmuskel
- Üblicherweise wird eine Auffrischungsimpfung („Booster“) durchgeführt. Bei Kindern ohne bekannte Exposition kann eine Grundimmunisierung empfohlen sein.

ZUSAMMENSETZUNG

Der Impfstoff enthält mRNA (Bauplan für das Protein LP.8.1) in Lipidnanopartikeln.

Weitere Bestandteile:

- ALC-0315, ALC-0159 (Lipide)
- DSPC (Distearoylphosphatidylcholin)
- Cholesterol
- Trometamol, Trometamolhydrochlorid
- Saccharose
- Wasser für Injektionszwecke

Der Impfstoff enthält kein vermehrungsfähiges Virus und kann keine COVID-19-Erkrankung auslösen.

NEBENWIRKUNGEN

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:

- Reaktionen an der Einstichstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung)
- Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen
- Schüttelfrost, Fieber, Durchfall, Übelkeit/Erbrechen, vergrößerte Lymphknoten

Selten (1 von 1000): vorübergehende einseitige Lähmung des Gesichtsnerven, allergische Reaktion

Sehr selten (1 von 10 000): Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung

WICHTIGE HINWEISE

- Der Impfschutz beginnt etwa 7–14 Tage nach der letzten Impfdosis.
- Die Empfehlung für Auffrischungsimpfungen basiert auf Beobachtungen der letzten Jahre, dass nach einer Auffrischungsimpfung das Auftreten von symptomatischen Infektionen um etwa 40–50 % reduziert wird, vor allem in den Monaten nach der Auffrischungsimpfung.
- Die Impfung ersetzt nicht allgemeine Schutzmaßnahmen wie Hygieneregeln, Maskentragen oder Abstandhalten in Infektionswellen.
- Bitte melden Sie uns Nebenwirkungen und Reaktionen.

Diesem Informationsblatt ist die Gebrauchsinformation des Impfstoffes beigelegt, die über Zusammensetzung, Gegenanzeigen und mögliche Nebenwirkungen detailliert informiert.

QUELLEN:

- Impfempfehlung COVID-19, Version 1.0, 12. August 2025
<https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan-Oesterreich.html>
- Gebrauchsinformation Comirnaty LP.8.1 30 mcg/Dosis Injektionsdispersion